

《新型コロナウイルス》のワクチンの注射をするとき気をつけること
(5~11歳で、初めて注射をします)

子どもの家族のみなさんへ

- ◎子どもが注射をするとき、いっしょにいてください。
- ◎予診票にお父さんやお母さんの名前を書いてください。書いてないと注射ができません。
- ◎わからないことがあるとき、国や市などのお知らせを見たり、子どもがいつも行っている医者にご相談してから、注射をするか決めてください。

《新型コロナウイルス》のワクチンの注射

国や市などが《新型コロナウイルス》(SARS-CoV-2)のための注射を用意しました。お金はいりません。5~11歳で、初めて注射をする人だけです。

ワクチンと注射のし方

ファイザー社の子ども用のオミクロン株対応1価ワクチン(オミクロン株XBB.1.5)です。注射の後、《新型コロナウイルス》にかかっても体の具合がとて悪くならないようにしたり、かかりにくくなったり、かかっても病気にならないようになったりするためです。

オミクロン株対応2価ワクチンの試験で中和抗体価が上がったり、効果があることがわかりました。試験でヒトの免疫応答の予測ができることがわかりました。試験でこのワクチンを初めて注射をすると、XBB.1.5の中和抗体ができることがわかったため、病気になりにくかったり、体の具合がとて悪くなりにくかったりするかもしれません。

ワクチンの名前	コミナティ筋注 5~11歳用 (1価:オミクロン株XBB.1.5)
注射の後	SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス)にかかりにくくなります。
注射の回数	2回 (1回目の注射から3週間あけます) ※筋肉の中に注射をします。
注射ができる人	新型コロナワクチンの注射を初めてする5~11歳
ワクチンの量	1回分 0.2mLをぜんぶで2回 ※効果のある薬の量は、10 μ g (12歳以上の3分の1)

- 1回目の注射から、3週間たったら、できるだけすぐに2回目の注射をしてください。
- ファイザー社の注射をした後、ほかの注射は、できません。2回目の注射が終わってからほかの注射をしてください。
- 注射をしても《新型コロナウイルス》にかかるかもしれないですから、注射の後もかからないようにしてください。(マスクをしてください。手をしっかり洗って、消毒してください。あなたとほかの人の間をあけてください。)

つぎ こ ちゅうしゃ
次の 子どもは、注射が できません。

1. 37.5℃以上 熱が あります。37.5℃ なくても、いつもより 体温が とても 高いです。
2. 重い 急な 病気に かかっています。
3. ワクチンに 入っているもので、重い 過敏症※に なったことが あります。
4. 1～3以外で 注射が できない理由が あります。

わからないときや 心配な とき、医者に 教えてください。

※アナフィラキシーや、体 ぜんぶの 皮膚や 粘膜が かゆくなったり、赤くなったり、腫れたり する、息 を するとき 「ゼーゼー」と 音が する、息が できない、息が 苦しい、脈が 早い、血圧が 低いな どの アナフィラキシーの ようなもの

つぎ こ ちゅうしゃ
次の 1～6 の 子どもは、注射を する前に 医者に かならず 教えてください。

1. 血が 固まらないように 治しています。血小板が 少なくなる病気や 血が 固まりにくい障害が あります。
2. 免疫不全に なったことが あります。家族に 免疫不全の 人が います。
3. 心臓、腎臓、肝臓、血液の 病気や、体が 大きくなならない病気などが あります。
4. 注射を した後、2日以内に、熱が 出たり、体 ぜんぶに 何か できたり するなど、アレルギーのよ うなものが 出たことが あります。
5. けいれんく急に 手や 足が つっぱったり、体が 動かなくなったり したことゝが あります。
6. ワクチンで アレルギーが おこるかもしれないです。

子どもが 薬で 過敏症や アレルギーに なったことが あるとき、注射の 前に 医者に かならず 教え てください。

ちゅうしゃ あと まも
注射の 後、1～3を 守ってください。

1. 注射の 後、15分以上 (アナフィラキシーなどの 重い アレルギーに なったり、体の 具合が 悪く なったり、気を 失ったり したことが ある人は、30分以上)、注射を したところに いてください。もし、体の 具合が 悪くなったら、すぐに 医者に 教えてください。(すぐ 医者が 診てくれます。)
2. 注射を したところをきれいに してください。注射を した日は、風呂に入ったり、シャワーを 浴びた りしても いいです。でも、注射を したところは、強く こすらないでください。注射を した後に 体の 具合が 悪く なったら、風呂に 入ったり、シャワーを 浴びたり しないで ください。
3. 注射を した日は、運動を しないでください。

ちゅうしゃ あと からだ ぐあい わる ふくはんのう
注射の 後、体の 具合が 悪くなるかもしれません。(副反応)

たと
例えば、

● 注射をしたところ、頭、関節や筋肉が痛いです。

● とても疲れます。

● 寒いです。

● 熱が出ました。

● とてもひどいとき、ショックやアナフィラキシーがあります。

新しいワクチンですから、新しい副作用がでるかもしれません。気がついたら、注射をした医者かいつもみってくれる医者に相談してください。

● 心筋炎や心膜炎のような病気が起きることがあります。注射をして、2・3日以内に胸が痛くなったり、動悸、息が切れたり、体がむくんだりしたら、すぐ病院に行ってください。

● 注射の後にギラン・バレー症候群になる人がいます。手や足の力が入りにくくなった、しびれたりしたら、すぐに病院で診てもらってください。

予防接種健康被害救済制度

注射をした後、治らない病気や障害になったとき、あなたと家族を助ける制度です。予防接種法で決まっています。

病院などでかかったお金が戻ってきたり、障害になったとき、年金がもらえます。申し込みや相談は、市役所でできます。

《新型コロナウイルス》について

SARS-CoV-2というウイルスのせいで、《新型コロナウイルス》にかかります。熱やせきがでるなど、かぜに似ています。治る人が多いですが、悪くなると、息が苦しくなって、肺炎などにかかります。ひどくなると、死ぬこともあります。

注射のワクチン（ファイザー社の5～11歳のオミクロン株対応1価ワクチン（XBB.1.5））はどんなワクチンですか？

このワクチンは、メッセンジャーRNA（mRNA）を油で包んだものです。

mRNAは、SARS-CoV-2（ウイルス）のスパイクタンパク質（ヒトの細胞に入るために必要なタンパク質）をつくるためのものです。注射すると、mRNAがあなたの細胞に入って、スパイクタンパク質ができます。そして、その働きを中和する抗体と免疫ができて、SARS-CoV-2による感染症にかかりにくくなります。

このワクチンに、次のものが入っています。

効果が あるもの	◇ ラクストジナメラン（オミクロン株 XBB.1.5 の スパイクタンパク質全体の情報を伝える mRNA）
ほかに入っているもの	◇ ALC-0315：[(4-ヒドロキシブチル)アザンジイル]ビス（ヘキサン-6と1-ジイル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル）

- ◇ ALC-0159:2- [(ポリエチレングリコール) -2000] -N, N-ジテトラデシルアセトアミド
- ◇ DSPC: 1, 2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
- ◇ コレステロール
- ◇ せいせいはいくとう 精製白糖
- ◇ トロメタモール
- ◇ トロメタモール えんさんえん 塩酸塩