

《新型コロナウイルス》のワクチンの注射をするとき気をつけること
(5~11歳で、2回以上注射をしました。)

子どもの家族のみなさんへ

- ◎子どもが注射をするとき、いっしょにいてください。
- ◎予診票にお父さんやお母さんの名前を書いてください。書いてないと注射ができません。
- ◎わからないことがあるとき、国や市などのお知らせを見たり、子どもがいつも行っている医者にご相談してから、注射をするか決めてください。

《新型コロナウイルス》のワクチンの注射

国や市などが《新型コロナウイルス》(SARS-CoV-2)のための注射を用意しました。お金はいりません。5~11歳で、2回以上注射をした子どもだけです。

ワクチンと注射のし方

ファイザー社の子ども用のオミクロン株対応1価ワクチン(オミクロン株 XBB.1.5)です。注射の後、《新型コロナウイルス》にかかっても体の具合がとて悪くならないようにしたり、かかりにくくなったり、かかっても病気にならないようになったりするためです。

オミクロン株対応2価ワクチンの試験で中和抗体価が上がったり、効果があることがわかりました。試験でヒトの免疫応答の予測ができることがわかりました。試験でこのワクチンを注射すると、XBB.1.5の中和抗体ができることがわかったため、病気になりにくかったり、体の具合がとて悪くなりにくかったりするかもしれません。

ワクチンの名前	コミナティ筋注 5~11歳用 (1価:オミクロン株 XBB.1.5)
注射の後	SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス)にかかりにくくなります。
注射の回数	1回 (1回目の注射から3週間あけます) ※筋肉の中に注射をします。
注射ができる人	新型コロナワクチンの注射を2回以上した5~11歳
ワクチンの量	1回分 0.2mLをぜんぶで1回 ※効果のある薬の量は、10 μ g (12歳以上の3分の1)

- 前に注射をしたワクチンの会社と違う会社のワクチンでも良いです。
- 注射をしても《新型コロナウイルス》にかかるかもしれないですから、注射の後もかからないようにしてください。(マスクをしてください。手をしっかり洗って、消毒してください。あなたとほかの人の間をあけてください。)

次の子どもは、注射ができません。

1. 37.5℃以上 熱が あります。37.5℃ なくても、いつもより 体温が とても 高いです。
2. 重い 急な 病気に かかっています。
3. ワクチンに 入っているもので、重い 過敏症※に なったことが あります。
4. 1～3以外で 注射が できない理由が あります。

わからないときや 心配な とき、医者に 教えてください。

※アナフィラキシーや、体 ぜんぶの 皮膚や 粘膜が かゆくなったり、赤くなったり、腫れたり する、息 を するとき 「ゼーゼー」と 音が する、息が できない、息が 苦しい、脈が 早い、血圧が 低いな どの アナフィラキシーの ようなもの

次の 1～6 の 子どもは、注射を する前に 医者に かならず 教えてください。

1. 血が 固まらないように 治しています。血小板が 少なくなる病気や 血が 固まりにくい障害が あります。
2. 免疫不全に なったことが あります。家族に 免疫不全の 人が います。
3. 心臓、腎臓、肝臓、血液の 病気や、体が 大きくなならない病気などが あります。
4. 注射を した後、2日以内に、熱が 出たり、体 ぜんぶに 何か できたり するなど、アレルギーのよ うなものが 出たことが あります。
5. けいれんく急に 手や 足が つっぱったり、体が 動かなくなったり したことゝが あります。
6. ワクチンで アレルギーが おこるかもしれないです。

子どもが 薬で 過敏症や アレルギーに なったことが あるとき、注射の 前に 医者に かならず 教えてください。

注射の 後、1～3を 守ってください。

1. 注射の 後、15分以上 (アナフィラキシーなどの 重い アレルギーに なったり、体の 具合が悪く なったり、気を 失ったり したことが ある人は、30分以上)、注射を したところに いてください。もし、体の 具合が悪くなったら、すぐに 医者に 教えてください。(すぐ 医者が 診てくれます。)
2. 注射を したところをきれいに してください。注射を した日は、風呂に入ったり、シャワーを 浴びたりしても いいです。でも、注射を したところは、強く こすらないでください。注射を した後に 体の 具合が悪く なったら、風呂に 入ったり、シャワーを 浴びたり しないで ください。
3. 注射を した日は、運動を しないでください。

注射の 後、体の 具合が悪くなるかもしれません。(副反応)

たとえば、

- 注射を したところ、頭、関節や 筋肉が 痛いです。
- とても 疲れます。

● 寒いです。

● 熱が 出ました。

● とても ひどいとき、ショックや アナフィラキシーが あります。

新しい ワクチンですから、新しい 副作用が できるかもしれません。気がついたら、注射を した 医者か いつも みてくれる医者に 相談してください。

● 心筋炎や 心膜炎のような 病気が 起きることが あります。注射を して、2・3日以内に 胸が 痛くなったり、動悸、息が 切れたり、体が おくんだり したら、すぐ 病院に 行ってください。

● 注射の 後に ギラン・バレー症候群に なる人が います。手や 足の 力が 入りにくく なったり、しびれたり したら、すぐに 病院で 診てもらってください。

予防接種健康被害救済制度

注射を した後、治らない病気が 障害に なったとき、あなたと 家族を 助ける制度です。予防接種法で 決まっています。

病院などで かかったお金が 戻ってきたり、障害に なったとき、年金が もらえます。申し込みや 相談は、市役所で できます。

《新型コロナウイルス》について

SARS-CoV-2 と いうウイルスの せいで、《新型コロナウイルス》に かかります。熱や せきが できるなど、かぜに 似ています。治る人が 多いですが、悪くなると、息が 苦しくなって、肺炎などに かかります。ひどくなると、死ぬことも あります。

注射の ワクチン（ファイザー社の 5～11歳の オミクロン株対応1価ワクチン（XBB.1.5））は どの ワクチンですか？

この ワクチンは、メッセンジャーRNA（mRNA）を 油で 包んだものです。

mRNA は、SARS-CoV-2（ウイルス）の スパイクタンパク質（ヒトの 細胞に 入るために 必要な タンパク質）を つくるための ものです。注射すると、mRNA が あなたの 細胞に 入って、スパイクタンパク質が できます。そして、その 働きを 中和する抗体と 免疫が できて、SARS-CoV-2 に よる感染症に かかりにくくなります。

この ワクチンに、次の ものが 入っています。

効果が あるもの	◇ ラクストジナメラン（オミクロン株 XBB.1.5 の スパイクタンパク質全体の 情報を 伝える mRNA）
ほかに 入っているもの	◇ ALC-0315：[(4-ヒドロキシブチル) アザンジール] ビス（ヘキサン-6 と 1-ジイル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル） ◇ ALC-0159：2- [(ポリエチレングリコール) -2000] -N, N-ジテトラデシルアセトアミド ◇ DSPC：1, 2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン

- ◇ コレステロール
- ◇ せいせいはいくとう 精製白糖
- ◇ トロメタモール
- ◇ トロメタモール えんさんえん 塩酸塩