

《新型コロナウイルス》のワクチンの注射をするとき気をつけること
(6か月～4歳で、初めて注射をします。)

注射をする子どもの家族へ

- ◎注射をするとき、子どもと いっしょに いてください。
- ◎予診票に お父さんや お母さんの 名前を 書いてください。書いていないと、注射が できません。
- ◎わからないことが あるとき、国や 市などの お知らせを 見たり、子どもが いつも 行っている 医者に 相談してください。

《新型コロナウイルス》の ワクチンの 注射

国や 市などが 《新型コロナウイルス》(SARS-CoV-2) のための 注射を 用意しました。お金は ありません。初めて 注射を する6か月～4歳の 子どもだけです。

ワクチンと 注射の し方

ファイザー社の オミクロン株対応1価ワクチンです。注射の 後、《新型コロナウイルス》に かかっても 体の 具合が とても 悪く ならないように したり、かかりにくく なったり、かかっても 病気に ならない ように なったり するためです。

オミクロン株対応2価ワクチンの 試験で 中和抗体価が 上がったり、効果が あることが わかりました。試験で ヒトの 免疫応答の 予測が できることが わかりました。試験で この ワクチンを 初めて 注射 を すると、XBB.1.5 の 中和抗体が できることが わかったため、病気に なりにくかったり、体の 具合が とても 悪くなり にくかったり するかもしれません。

ワクチンの 名前	コミナティ筋注 6か月～4歳用 (1価:オミクロン株 XBB.1.5)
注射の 後	SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス) に かかりにくく なります。
注射の 回数	3回 (1回目の 注射から 3週間 あけて 2回目の 注射を します。2回目の 注射から 8週間 あけて 3回目の 注射を します。) ※筋肉の 中に 注射 を します。
注射が できる人	初めて 注射を する6か月～4歳
ワクチンの 量	1回分 0.2mL を ぜんぶで 3回 ※注射を する有効な 成分の 量は、3 μ g (12歳以上の 10分の 1)

- 1回目の 注射から 3週間 あいたときや 2回目の 注射から 8週間 あいたとき、できるだけ はやく注射を してください。
- 3回目の 注射が 終わってから、7日くらい たたないと、免疫〈病気と 機能〉が できないと 言われています。また、注射を しても 《新型コロナウイルス》に かかるかもしれないですから、注射の 後も

かからないように してください。(マスクを してください。手を しっかり 洗って、消毒してください。
子どもと ほかの 人の 間を あけてください。)

次の 人は、注射が できません。

1. 37.5℃以上 熱が あります。37.5℃ なくても、いつもより 体温が とても 高いです。
2. 重い 急な 病気に かかっています。
3. ワクチンに 入っているもので、重い 過敏症※に なったことが あります。
4. 1~3以外で 注射が できない理由が あります。

わからないときや 心配な とき、医者に かならず 教えてください。

※アナフィラキシーや、体 ぜんぶの 皮膚や 粘膜が かゆくなったり、赤くなったり、腫れたり する、息
を するとき 「ゼーゼー」と 音が する、息が できない、息が 苦しい、脈が 早い、血圧が 低いな
どの アナフィラキシーの ようなもの

次の 1~6 の 人は、注射を する前に 医者に かならず 教えてください。

1. 血が 固まらないように 治しています。血小板が 少なくなる病気や 血が 固まりにくい障害が あり
ます。
2. 免疫不全に なったことが あります。家族に 免疫不全の 人が います。
3. 心臓、腎臓、肝臓、血液の 病気や、体が 大きくなならない病気などが あります。
4. 注射を した後、2日以内に、熱が 出たり、体 ぜんぶに 何か できたり するなど、アレルギーのよ
うなものが 出たことが あります。
5. けいれんく急に 手や 足が つっぱったり、体が 動かなくなったり したことが あります。
6. ワクチンで アレルギーが おこるかもしれないです。

この ワクチンに 今まで 使ったことがないものが 入っています。薬で 過敏症や アレルギーに なった
ことが ある人は、注射の 前に 医者に かならず 教えてください。

注射の 後、1~3を 守ってください。

1. 注射の 後、15分以上 (アナフィラキシーなどの 重い アレルギーに なったり、体の 具合が悪く
なったり、気を 失ったり したことが ある人は、30分以上)、注射を したところに いてください。
もし、体の 具合が悪くなったら、すぐに 医者に 教えてください。(すぐ 医者が 診てくれます)
2. 注射を したところをきれいに してください。注射を した日は、風呂に入ったり、シャワーを 浴びた
りしても いいです。でも、注射を したところは、強く こすらないでください。
注射を した後に 体の 具合が悪く なったら、風呂に 入ったり、シャワーを 浴びたり しないで
ください。
3. 注射を した日は、運動を しないでください。

ちゅうしゃ あと からだ ぐあい わる ふくはんのう
注射の後、体の具合が悪くなるかもしれません。(副反応)

たと
例えば、

● 注射をしたところ、頭、関節や筋肉が痛いです。

● とても疲れます。

● 寒いです。

● 熱が出ました。

● とてもひどいとき、ショックやアナフィラキシーがあります。

あたら あた かんせつ ふくさよう き ちゅうしゃ
新しいワクチンですから、新しい副作用がでるかもしれません。気がついたら、注射をした
いしゃ いつも みてくれる医者 に 相談してください。

● 心筋炎や心膜炎のような病気が起きることがあります。注射をして、2・3日以内に胸が
痛くなったり、動悸、息が切れたり、体がむくんだりしたら、すぐ病院に行ってください。

● 注射の後にギラン・バレー症候群になる人がいます。手や足の力が入りにくくなっ
り、しびれたりしたら、すぐに病院で診てもらってください。

よぼうせっしゅけんこうひがいきゅうさいせいど 予防接種健康被害救済制度

ちゅうしゃ あと なお びょうき しょうがい かぞく たす せいど よぼうせっしゅほう
注射をした後、治らない病気や障害になったとき、あなたと家族を助ける制度です。予防接種法で
き
決まっています。

びょういん かね もど しょうがい ねんきん もう こ そうだん
病院などでかかったお金が戻ってきたり、障害になったとき、年金がもらえます。申し込みや相談は、
しやくしょ
市役所でできます。

しんがた 《新型コロナウイルス》について

SARS-CoV-2 というウイルスのせいで、《新型コロナウイルス》にかかります。熱やせきがでるなど、
かぜに似ています。治る人が多いですが、悪くなると、息が苦しくなって、肺炎などにかかります。ひどくな
ると、死ぬこともあります。

ちゅうしゃ しゃ かぶたいおういっか ろっげつ さい
注射のワクチン(ファイザー社のオミクロン株対応1価ワクチン(6か月～4歳のXBB.1.5))
はどんなワクチンですか？

このワクチンは、メッセンジャーRNA(mRNA)を油で包んだものです。

mRNAは、SARS-CoV-2(ウイルス)のスパイクタンパク質(ヒトの細胞に入るために必要なタンパク
質)をつくるためのものです。注射すると、mRNAがあなたの細胞に入って、スパイクタンパク質が
できます。そして、その働きを中和する抗体と免疫ができて、SARS-CoV-2による感染症にかか
りにくくなります。

このワクチンに、次のものが入っています。

こうか 効果が あるもの	☆ ラクストジナメラン(オミクロン株XBB.1.5のスパイクタンパク質全体の情報)
-----------------	---

	つた を 伝える mRNA)
ほかに ^{はい} 入っているもの	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ALC-0315 : [(4-ヒドロキシブチル) アザンジイル] ビス (ヘキサン-6 と 1-ジイル) ビス (2-ヘキシルデカン^{さん}酸エステル) ◇ ALC-0159 : 2- [(ポリエチレングリコール) -2000] -N, N-ジテトラデシルアセトアミド ◇ DSPC : 1, 2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ ^{せいせいはくとう}精製白糖 ◇ トロメタモール ◇ トロメタモール^{えんさんえん}塩酸塩