

《新型コロナウイルス》のワクチンの注射をするとき気をつけること  
(12~15歳で、初めて注射をします。)

注射をする子どもの家族へ

- ◎注射をするとき、子どもといっしょにいてください。
- ◎予診票は、お父さんやお母さんが書きます。お父さんやお母さんの名前を書いてください。書いていないと、注射ができません。
- ◎お父さんやお母さんがいっしょに来ないとき、予診票の「電話番号」のところに、お父さんやお母さんの電話番号を書いてください。
- ◎わからないことがあるとき、国や市などのお知らせを見たり、子どもがいつも行っている医者にご相談してください。

《新型コロナウイルス》のワクチンの注射

国や市などが《新型コロナウイルス》(SARS-CoV-2)のための注射を用意しました。お金はいりません。2回以上注射をした12歳以上のひとだけです。

ワクチンと注射のし方

ファイザー社のオミクロン株対応1価ワクチン(オミクロン株 XBB.1.5)です。注射の後、《新型コロナウイルス》にかかっても体の具合がとても悪くならないようにしたり、かかりにくくなったり、かかっても病気にならないようにしたりするためです。

オミクロン株対応2価ワクチンの試験で中和抗体価が上がったり、効果があることがわかりました。試験でヒトの免疫応答の予測ができることがわかりました。試験でこのワクチンを初めて注射をすると、XBB.1.5の中和抗体ができることがわかったため、病気になりにくかったり、体の具合がとても悪くなりにくかったりするかもしれません。

ワクチンの名前	コミナティ RTU 筋注 (1価:オミクロン株 XBB.1.5)
注射の後	SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス)にかかりにくくなります。
注射の回数	2回(1回目の注射から3週間あけます) ※筋肉の中に注射をします。
注射ができる人	初めて注射をする12歳以上
ワクチンの量	1回分 0.3mLをぜんぶで2回

- 1回目の注射から、3週間あいたら、できるだけ早く2回目の注射をしてください。
- 1回目の注射をした後、ほかの注射はできません。2回目の注射が終わってから、できます。

- 注射をしても「新型コロナウイルス」にかかるかもしれないですから、注射の後もかからないようにしてください。(マスクをしてください。手をしっかりと洗って、消毒してください。あなたとほかの人の間をあけてください。)

次の人は、注射ができません。

1. 37.5℃以上熱があります。37.5℃なくても、いつもより体温がとても高いです。
2. 重い急な病気にかかっています。
3. ワクチンに入っているもので、重い過敏症※になったことがあります。
4. 1～3以外で注射ができない理由があります。

わからないときや心配なとき、医者にかならず教えてください。

※アナフィラキシーや、体ぜんぶの皮膚や粘膜がかゆくなったり、赤くなったり、腫れたりする、息をするとき「ゼーゼー」と音がする、息ができない、息が苦しい、脈が早い、血圧が低いなどのアナフィラキシーのようなもの

次の1～6の人は、注射をする前に医者にかならず教えてください。

1. 血が固まらないように治しています。血小板が少なくなる病気や血が固まりにくい障害があります。
2. 免疫不全になったことがあります。家族に免疫不全の人がいます。
3. 心臓、腎臓、肝臓、血液の病気や、体が大きくなならない病気などがあります。
4. 注射をした後、2日以内に、熱が出たり、体ぜんぶに何かできたりするなど、アレルギーのようなものが出たことがあります。
5. けいれんく急に手や足がつっぱったり、体が動かなくなったりしたことがあることがあります。
6. ワクチンでアレルギーがおこるかもしれません。

赤ちゃんがおなかにいたり、赤ちゃんにお乳をあげたりしている人は、注射の前に医者にかならず教えてください。

薬で過敏症やアレルギーになったことがある人は、注射の前に医者に教えてください。

注射の後、1～3を守ってください。

1. 注射の後、15分以上(アナフィラキシーなどの重いアレルギーになったり、体の具合が悪くなったり、気を失ったりしたことがある人は、30分以上)、注射をしたところにいってください。もし、体の具合が悪くなったら、すぐに医者に教えてください。(すぐ医者が診てくれます)
2. 注射をしたところをきれいにしてください。注射をした日は、風呂に入ったり、シャワーを浴びたりしてもいいです。でも、注射をしたところは、強くこすらないでください。

ちゅうしゃ あと からだ ぐあい わる ふろ はい  
注射をした後に、体の具合が悪く になったら、風呂に入ったり、シャワーを 浴びたり しないで  
ください。

ちゅうしゃ ひ うんどう さけ の  
3. 注射をした日は、運動を しないでください。たくさん 酒を 飲まないでください。

ちゅうしゃ あと からだ ぐあい わる ふくはんのう  
注射の後、体の 具合が悪くなるかもしれません。(副反応)

たと  
例えば、

ちゅうしゃ あたま かんせつ きんにく いた  
● 注射をしたところ、頭、関節や 筋肉が 痛いです。

● とても 疲れます。

● 寒いです。

● 熱が 出ました。

● とても ひどいとき、ショックや アナフィラキシーが あります。

あたら あたら ふくさよう き ちゅうしゃ  
新しい ワクチンですから、新しい 副作用が できるかもしれません。気がついたら、注射を した

いしゃ いしゃ そうだん  
医者か いつも みてくれる医者に 相談してください。

しんきんえん しんまくえん びょうき お ちゅうしゃ にちいない おね  
● 心筋炎や 心膜炎のような 病気が 起きることが あります。注射を して、2・3日以内に 胸が  
いた 痛くなったり、どうき いき き からだ びょういん い  
痛くなったり、動悸、息が 切れたり、体が おくんだり したら、すぐ 病院に 行ってください。

ちゅうしゃ あと しょうこうぐん ひと て あし ちから はい  
● 注射の 後に ギラン・バレー症候群に なる人が います。手や 足の 力が 入りにくく なった  
り、しびれたり したら、すぐに 病院で 診てもらってください。

#### よぼうせっしゅけんこうひがいきゅうさいせいど 予防接種健康被害救済制度

ちゅうしゃ あと なお びょうき しょうがい かぞく たす せいど よぼうせっしゅほう  
注射をした後、治らない病気や 障害に なったとき、あなたと 家族を 助ける制度です。予防接種法で  
き  
決まっています。

びょういん かね もど しょうがい ねんきん もう こ そうだん  
病院などで かかったお金が 戻ってきたり、障害に なったとき、年金が もらえます。申し込みや 相談は、  
しやくしょ  
市役所で できます。

#### しんがた 《新型コロナウイルス》について

SARS-CoV-2 と いうウイルスの せいで、《新型コロナウイルス》に かかります。熱や せきが できるなど、  
かぜに 似ています。治る人が 多いですが、悪くなると、息が 苦しくなって、肺炎などに かかります。ひどくな  
ると、死ぬことも あります。

ちゅうしゃ しゃ かぶたいおういつ か  
注射の ワクチン（ファイザー社の オミクロン株対応1価ワクチン（XBB.1.5））は どんな ワク  
チンですか？

この ワクチンは、メッセンジャーRNA（mRNA）を あぶら つつ  
油で 包んだものです。

mRNA は、SARS-CoV-2（ウイルス）の スパイクタンパク質（ヒトの 細胞に 入るために 必要な タンパク  
質）を つくるための ものです。注射すると、mRNA が あなたの 細胞に 入って、スパイクタンパク質が  
できます。そして、その 働きを 中和する抗体と 免疫が できて、SARS-CoV-2 に よる感染症に かか  
りにくくなります。

この ワクチンに、<sup>つぎ</sup>次の <sup>はい</sup>ものが <sup>はい</sup>入っています。

<p>こうか 効果が あるもの</p>	<p>◇ ラクストジナメラン (オミクロン株 XBB.1.5 の <sup>かぶ</sup>スパイクタンパク質全体の <sup>しつぜんたい</sup>情報を <sup>じょうほう</sup>伝える mRNA)</p>
<p>ほかに <sup>はい</sup>入っているもの</p>	<p>◇ ALC-0315 : [(4-ヒドロキシブチル) アザンジイル] ビス (ヘキサン-6 と 1-ジイル) ビス (2-ヘキシルデカン<sup>さん</sup>酸エステル)</p> <p>◇ ALC-0159 : 2- [(ポリエチレングリコール) -2000] -N, N-ジテトラデシルアセトアミド</p> <p>◇ DSPC : 1, 2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン</p> <p>◇ コレステロール</p> <p>◇ トロメタモール</p> <p>◇ トロメタモール<sup>えんさんえん</sup>塩酸塩</p> <p>◇ <sup>せいせいはいくとう</sup>精製白糖</p>