

《新型コロナウイルス》のワクチンの注射をするとき 気をつけること (16歳以上で、初めて注射をします。)

《新型コロナウイルス》のワクチンの注射

国や市などが《新型コロナウイルス》(SARS-CoV-2)のための注射を用意しました。お金はいりません。2回以上注射をした12歳以上の 人だけです。

ワクチンと注射のし方

ファイザー社のオミクロン株対応1価ワクチン(オミクロン株 XBB.1.5)です。注射の後、《新型コロナウイルス》にかかっても体の具合が とても悪くならないようにしたり、かかりにくくなったり、かかっても病気にならないように なったり するためです。

オミクロン株対応2価ワクチンの試験で中和抗体価が 上がったり、効果が あることが わかりました。試験で ヒトの免疫応答の予測が できることが わかりました。試験で このワクチンを初めて注射を すると、XBB.1.5の中和抗体が できることが わかったため、病気に なりにくかったり、体の 具合が とても悪くなり にくかったり するかもしれません。

ワクチンの名前	コミナティ RTU筋注 (1価:オミクロン株 XBB.1.5)
注射の後	SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)に かかりにくく なります。
注射の回数	2回(1回目の注射から 3週間 あけます) ※筋肉の 中に注射を します。
注射ができる人	初めて注射を する12歳以上
ワクチンの量	1回分 0.3mLを ぜんぶで 2回

- 1回目の注射から、3週間 あいたら、できるだけ はやく 2回目の注射を してください。
- 1回目の注射をした後、ほかの注射は できません。2回目の注射が 終わってから、できます。
- 注射を しても 《新型コロナウイルス》に かかるかもしれないですから、注射の 後も にかからないように してください。(マスクを してください。手を しっかり 洗って、消毒 してください。あなたと ほかの 人の 間を あけてください。)

次の人は、注射が できません。

1. 37.5℃以上 熱が あります。37.5℃ なくても、いつもより 体温が とても 高いです。
2. 重い 急な 病気に かかっています。
3. ワクチンに 入っているもので、重い 過敏症※に なったことが あります。
4. 1~3以外で 注射が できない理由が あります。

わからないときや ^{しんばい}心配な ^{いしや}とき、^{いしや}医者に ^{おし}かならず ^{おし}教えてください。

※アナフィラキシーや、^{からだ}体 ^{ぜんぶの}皮膚や ^{ひふ}粘膜が ^{かゆくなったり、赤くなったり、腫れたり}かゆくなったり、赤くなったり、腫れたり ^いする、^{いき}息 ^{をし}するとき「ゼーゼー」と ^{おと}音が ^いする、^{いき}息が ^いできない、^{いき}息が ^{くる}苦しい、^{みやく}脈が ^{はや}早い、^{けつあつ}血圧が ^{ひく}低いなどの ^いアナフィラキシーの ^いようなもの

^{つぎ}次の ^{ひと}1～6の ^{ひと}人は、^{ちゅうしゃ}注射を ^{まへ}する前に ^{いしや}医者に ^{おし}かならず ^{おし}教えてください。

1. ^ち血が ^{かた}固まらないように ^{なお}治しています。 ^{けっしょうばん}血小板が ^{すく}少なくなる病気や ^{びょうき}血が ^{かた}固まりにくい障害が ^{しょうがい}あります。
2. ^{めんえきふぜん}免疫不全に ^ななったことが ^あります。 ^{かぞく}家族に ^{めんえきふぜん}免疫不全の ^{ひと}人が ^いいます。
3. ^{しんぞう}心臓、^{じんぞう}腎臓、^{かんぞう}肝臓、^{けつえき}血液の ^{びょうき}病気や、^{からだ}体が ^{おお}大きくなならない病気などが ^あります。
4. ^{ちゅうしゃ}注射を ^あした後、^{ふつかい}2日以内に、^{ねつ}熱が ^で出たり、^{からだ}体 ^{ぜんぶに}ぜんぶに ^{なに}何か ^{できたり}できたり ^{する}するなど、アレルギーのよ ^{うな}うなものが ^で出たことが ^あります。
5. ^{きゅう}けいれん〈急に ^て手や ^{あし}足が ^つつぱったり、^{からだ}体が ^{うご}動かなくなったり ^{した}したこと〉が ^あります。
6. ワクチンで ^{アレルギー}アレルギーが ^{おこ}るかもしれないです。

^{あか}赤ちゃんが ^{おな}おなかに ^{いた}いたり、^{あか}赤ちゃんに ^{おち}お乳を ^あげたり ^{して}している人は、^{ちゅうしゃ}注射の ^{まへ}前に ^{いしや}医者に ^{おし}かな ^らず ^{おし}教えてください。

^{くすり}薬で ^{かびんしょう}過敏症や ^{アレルギー}アレルギーに ^ななったことが ^ある人は、^{ちゅうしゃ}注射の ^{まへ}前に ^{いしや}医者に ^{おし}教えてください。

^{ちゅうしゃ}注射の ^あ後、^{まも}1～3を ^{まも}守ってください。

1. ^{ちゅうしゃ}注射の ^あ後、^{ふんいじょう}15分以上（アナフィラキシーなどの ^{おも}重い ^{アレルギー}アレルギーに ^ななったり、^{からだ}体の ^{ぐあい}具合が ^{わる}悪く ^ななったり、^き気を ^{うしな}失ったり ^{した}ことがある人は、³⁰30分以上）、^{ちゅうしゃ}注射を ^{した}したところに ^いいてください。
もし、^{からだ}体の ^{ぐあい}具合が ^{わる}悪くなったら、^{いしや}すぐに ^{いしや}医者に ^{おし}教えてください。（^{すぐ}すぐ ^{いしや}医者が ^み診てくれます）
2. ^{ちゅうしゃ}注射を ^{した}したところを ^{きれい}きれいに ^{して}してください。 ^{ちゅうしゃ}注射を ^{した}した日は、^{ふうりょ}風呂に ^い入ったり、^{シャワー}シャワーを ^あ浴びたりしても ^いいいです。でも、^{ちゅうしゃ}注射を ^{した}したところは、^{つよ}強く ^ここすらないでください。
3. ^{ちゅうしゃ}注射を ^{した}した日は、^{うんどう}運動を ^ししないでください。 ^{たくさん}たくさん ^{さけ}酒を ^の飲まないでください。

^{ちゅうしゃ}注射の ^あ後、^{からだ}体の ^{ぐあい}具合が ^{わる}悪くなるかもしれません。（^{ふくはんのう}副反応）

^{たと}例えば、

- ^{ちゅうしゃ}注射を ^{した}したところ、^{あたま}頭、^{かんせつ}関節や ^{きんにく}筋肉が ^{いた}痛いです。
- とても ^{つか}疲れます。
- ^{さむ}寒いです。
- ^{ねつ}熱が ^で出ました。
- とても ^{ひどい}ひどいとき、^{ショック}ショックや ^{アナフィラキシー}アナフィラキシーが ^あります。

あたらしい ワクチンですから、あたらしい 副作用が できるかもしれません。気がついたら、注射をした
医者か いつも みてくれる医者に 相談してください。

- 心筋炎や 心膜炎のような 病気が 起きることが あります。注射を して、2・3日以内に 胸が
痛くなったり、動悸、息が 切れたり、体が おくんだり したら、すぐ 病院に 行ってください。
- 注射の 後に ギラン・バレー 症候群に なる人が います。手や 足の 力が 入りにくく なった
り、しびれたり したら、すぐに 病院で 診てもらってください。

予防接種健康被害救済制度

注射をした後、治らない病気や 障害に なったとき、あなたと 家族を 助ける制度です。予防接種法で
決まっています。

病院などで かかったお金が 戻ってきたり、障害に なったとき、年金が もらえます。申し込みや 相談は、
市役所で できます。

《新型コロナウイルス》について

SARS-CoV-2 と いうウイルスの せいで、《新型コロナウイルス》に かかります。熱や せきが できるなど、
かぜに 似ています。治る人が 多いですが、悪くなると、息が 苦しくなって、肺炎などに かかります。ひどくな
ると、死ぬことも あります。

注射の ワクチン（ファイザー社の オミクロン株対応1価ワクチン（XBB.1.5））は どんな ワク
チンですか？

この ワクチンは、メッセンジャーRNA（mRNA）を 油で 包んだものです。

mRNA は、SARS-CoV-2（ウイルス）の スパイクタンパク質（ヒトの 細胞に 入るために 必要な タンパク
質）をつくるための ものです。注射すると、mRNAが あなたの 細胞に 入って、スパイクタンパク質が
できます。そして、その 働きを 中和する抗体と 免疫が できて、SARS-CoV-2に よる感染症に かか
りにくくなります。

この ワクチンに、次の ものが 入っています。

効果が あるもの	◇ ラクストジナメラン（オミクロン株 XBB.1.5 の スパイクタンパク質全体の 情報 を 伝える mRNA）
ほかに 入って いるもの	◇ ALC-0315：[(4-ヒドロキシブチル) アザンジール] ビス（ヘキサン-6 と 1-ジ イル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル） ◇ ALC-0159：2- [(ポリエチレングリコール) -2000] -N, N-ジテトラデシルア セトアミド ◇ DSPC：1, 2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ トロメタモール ◇ トロメタモール塩酸塩

せいせいはくとう
◇ 精製白糖