

《新型コロナウイルス》のワクチンの注射をするとき気をつけること
(16歳以上で、2回以上注射をしました。)

《新型コロナウイルス》のワクチンの注射

国や市などが《新型コロナウイルス》(SARS-CoV-2)のための注射を用意しました。お金はいりません。2回以上注射をした12歳以上のひとだけです。

ワクチンと注射のし方

ファイザー社のオミクロン株対応1価ワクチン(オミクロン株 XBB.1.5)です。注射の後、《新型コロナウイルス》にかかっても体の具合がとて悪くならないようにしたり、かかりにくくなったり、かかっても病気にならないようにしたりするためです。

オミクロン株対応2価ワクチンの試験で中和抗体価が上がったり、効果があることがわかりました。試験でひとの免疫応答の予測ができることがわかりました。試験でこのワクチンを注射すると、XBB.1.5の中和抗体ができることがわかったため、病気になりにくかったり、体の具合がとて悪くなりやすかったりするかもしれません。

ワクチンの名前	コミナティ RTU 筋注 (1価:オミクロン株 XBB.1.5)
注射の後	SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス)にかかりにくくなります。
注射の回数	1回(前の注射から3か月以上あけます) ※筋肉の中に注射をします。
注射ができる人	2回以上注射をした12歳以上
ワクチンの量	1回分 0.3mLをぜんぶで1回

- 前のワクチンの会社と違う会社でもいいです。
- 注射をしても《新型コロナウイルス》にかかるかもしれないですから、注射の後もかからないようにしてください。(マスクをしてください。手をしっかり洗って、消毒してください。あなたとほかの人の間をあけてください。)

次の人は、注射ができません。

1. 37.5℃以上熱があります。37.5℃なくても、いつもより体温がとて高いです。
2. 重い急な病気にかかっています。
3. ワクチンに入っているもので、重い過敏症※になったことがあります。
4. 1~3以外で注射ができない理由があります。

わからないときや心配なとき、医者にかならず教えてください。

※アナフィラキシーや、体 ぜんぶの 皮膚や 粘膜が かゆくなったり、赤くなったり、腫れたり する、息 を するとき 「ゼーゼー」と 音が する、息が できない、息が 苦しい、脈が 早い、血圧が 低いな どの アナフィラキシーの ようなもの

次の 1~6 の 人は、注射を する前に 医者に かならず 教えてください。

1. 血が 固まらないように 治しています。血小板が 少なくなる病気や 血が 固まりにくい障 害が あり ます。
2. 免疫不全に なったことが あります。家族に 免疫不全の 人が います。
3. 心臓、腎臓、肝臓、血液の 病気や、体 が 大きくなならない病気などが あります。
4. 注射を した後、2日以内に、熱が 出たり、体 ぜんぶに 何か できたり するなど、アレルギーのよ うなものが 出たことが あります。
5. けいれん〈急に 手や 足が つっぱったり、体 が 動かなくなったり したこと〉が あります。
6. ワクチンで アレルギーが おこるかもしれないです。

赤ちゃんが おなかに いたり、赤ちゃんに お乳を あげたり している人は、注射の 前に 医者に 教え てください。

薬で 過敏症や アレルギーに なったことが ある人は、注射の 前に 医者に かならず 教えてください。

注射の 後、1~3を 守ってください。

1. 注射の 後、15分以上 (アナフィラキシーなどの 重い アレルギーに なったり、体の 具合が 悪く なったり、気を 失ったり したことが ある人は、30分以上)、注射を したところに いてください。 もし、体の 具合が 悪くなったら、すぐに 医者に 教えてください。(すぐ 医者が 診てくれます)
2. 注射を したところをきれいに してください。注射を した日は、風呂に 入ったり、シャワーを 浴びた りしても いいです。でも、注射を したところは、強く こすらないでください。
注射を した後に 体の 具合が 悪く なったら、風呂に 入ったり、シャワーを 浴びたり しないで ください。
3. 注射を した日は、運動を しないでください。たくさん 酒を 飲まないでください。

注射の 後、体の 具合が 悪くなるかもしれません。(副反応)

たとえば、

- 注射を したところ、頭、関節や 筋肉が 痛いです。
- とても 疲れます。
- 寒いです。
- 熱が 出ました。
- とても ひどいとき、ショックや アナフィラキシーが あります。

あたらしい ワクチンですから、あたらしい 副作用が できるかもしれません。気がついたら、注射をした
医者か いつも みてくれる医者に 相談してください。

- 心筋炎や 心膜炎のような 病気が 起きることが あります。注射を して、2・3日以内に 胸が
痛くなったり、動悸、息が 切れたり、体が おくんだり したら、すぐ 病院に 行ってください。
- 注射の 後に ギラン・バレー 症候群に なる人が います。手や 足の 力が 入りにくく なった
り、しびれたり したら、すぐに 病院で 診てもらってください。

予防接種健康被害救済制度

注射をした後、治らない病気や 障害に なったとき、あなたと 家族を 助ける制度です。予防接種法で
決まっています。

病院などで かかったお金が 戻ってきたり、障害に なったとき、年金が もらえます。申し込みや 相談は、
市役所で できます。

《新型コロナウイルス》について

SARS-CoV-2 と いうウイルスの せいで、《新型コロナウイルス》に かかります。熱や せきが できるなど、
かぜに 似ています。治る人が 多いですが、悪くなると、息が 苦しくなって、肺炎などに かかります。ひどくな
ると、死ぬことも あります。

注射の ワクチン（ファイザー社の オミクロン株対応1価ワクチン（XBB.1.5））は どんな ワク
チンですか？

この ワクチンは、メッセンジャーRNA（mRNA）を 油で 包んだものです。

mRNA は、SARS-CoV-2（ウイルス）の スパイクタンパク質（ヒトの 細胞に 入るために 必要な タンパク
質）をつくるための ものです。注射すると、mRNAが あなたの 細胞に 入って、スパイクタンパク質が
できます。そして、その 働きを 中和する抗体と 免疫が できて、SARS-CoV-2に よる感染症に かか
りにくくなります。

この ワクチンに、次の ものが 入っています。

効果が あるもの	◇ ラクストジナメラン（オミクロン株 XBB.1.5 の スパイクタンパク質全体の 情報 を 伝える mRNA）
ほかに 入って いるもの	◇ ALC-0315：[(4-ヒドロキシブチル) アザンジール] ビス（ヘキサン-6 と 1-ジ イル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル） ◇ ALC-0159：2- [(ポリエチレングリコール) -2000] -N, N-ジテトラデシルア セトアミド ◇ DSPC：1, 2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ トロメタモール ◇ トロメタモール塩酸塩

◇ せいせいはくとう
精製白糖