

平成 29 年度分新規認定者の状況確認報告書

平成 29 年度の新規認定者 545 人に係る「原因疾患、年齢、性別、介護度、住所地区」をそれぞれ確認した。

1. 新規認定者に係る年齢及び性別の状況（H29 年 4 月～H30 年 3 月分）




図 1 新規認定者

- ・新規認定者は、85 歳～84 歳が一番多い。次いで、90 歳～94 歳、80 歳～84 歳が多い。
- ・平均年齢：83.4 歳 男性：82.3 歳 女性：84.3 歳
- ・参考 2017 年日本人の平均寿命 男性：81.09 歳 女性：87.26 歳




図 2 新規認定者 男女比

- ・全体の男女比率 男性：47.0% 女性：53.0%
- ・年齢が高くなるにつれ、女性の占める割合が高くなる。

1.新規認定者の年齢状況（H 29年4月～H 30年3月分）

年齢	人数	男	女	全体	男	女
40～44	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
45～49	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
50～54	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
55～59	3	2	1	1.0%	1.0%	0.0%
60～64	3	2	1	1.0%	1.0%	0.0%
65～69	33	21	12	6.0%	8.0%	4.0%
70～74	44	22	22	8.0%	9.0%	8.0%
75～79	81	43	38	15.0%	17.0%	13.0%
80～84	103	51	52	19.0%	20.0%	18.0%
85～89	136	51	85	25.0%	20.0%	29.0%
90～94	113	49	64	21.0%	19.0%	22.0%
95～99	25	10	15	5.0%	4.0%	5.0%
100～	4	3	1	1.0%	1.0%	0.0%
計	545	254	291	100.0%	100.0%	100.0%
占有率	100.0%	47.0%	53.0%			

2. 新規認定者の介護度に係る年齢、性別等について




図 3 介護度別 年齢状況(全体)

- ・ 要介護 1 が一番多く、次いで要支援 2、要介護 2 が多い。

2-1. 全体 年齢別の要介護状況

年齢	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	非該当	合計	年齢占有率
40~44									0	—
45~49									0	—
50~54									0	—
55~59		1	1		1				3	1.0%
60~64			1			1	1		3	1.0%
65~69	4	6	6	5	6	2	4		33	6.0%
70~74	4	8	13	7	4	4	3	1	44	8.0%
75~79	15	9	25	11	9	7	5		81	15.0%
80~84	16	23	23	16	10	11	4		103	19.0%
85~89	22	28	38	29	7	5	7		136	25.0%
90~94	15	21	32	21	12	6	6		113	21.0%
95~99	3	1	6	7	4	3	1		25	5.0%
100~	1	0			2		1		4	1.0%
計	80	97	145	96	55	39	32	1	545	100.0%
介護度占有率	15.0%	18.0%	27.0%	18.0%	10.0%	7.0%	6.0%	0.0%	100.0%	—

2-2. 男性 年齢別の要介護状況

年齢	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	非該当	合計	年齢占有率
40~44									0	—
45~49									0	—
50~54									0	—
55~59		1			1				2	1.0%
60~64			1			1			2	1.0%
65~69	1	3	5	4	4	1	3		21	8.0%
70~74	1	4	7	3	1	2	3	1	22	9.0%
75~79	8	3	14	5	7	3	3		43	17.0%
80~84	5	7	15	10	6	4	4		51	20.0%
85~89	6	7	14	13	4	3	4		51	20.0%
90~94	8	7	10	11	4	6	3		49	19.0%
95~99	1		4	2	1	2			10	4.0%
100~					2		1		3	1.0%
計	30	32	70	48	30	22	21	1	254	100.0%
介護度占有率	12.0%	13.0%	28.0%	19.0%	12.0%	9.0%	8.0%	0.0%	100.0%	—

2-3 女性 年齢別の要介護状況

年齢	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	非該当	合計	年齢占有率
40～44									0	—
45～49									0	—
50～54									0	—
55～59			1						1	0.0%
60～64							1		1	0.0%
65～69	3	3	1	1	2	1	1		12	4.0%
70～74	3	4	6	4	3	2			22	8.0%
75～79	7	6	11	6	2	4	2		38	13.0%
80～84	11	16	8	6	4	7			52	18.0%
85～89	16	21	24	16	3	2	3		85	29.0%
90～94	7	14	22	10	8		3		64	22.0%
95～99	2	1	2	5	3	1	1		15	5.0%
100～	1								1	0.0%
計	50	65	75	48	25	17	11	0	291	100.0%
介護度占有率	17.0%	22.0%	26.0%	16.0%	9.0%	6.0%	4.0%	0.0%	100.0%	—




図 4 要介護度 男女

- ・男性は介護度1が最も多く、次いで要介護2。女性は介護度1が最も多く、次いで要支援2。



図 5 介護度別 男女比

- ・要介護度が上がるにつれて、女性の占める割合が低い。




図 6 介護度別 年齢状況(男)

- ・男性は、要介護 1 が一番多く、次いで要介護 2 が多い。




図 7 介護度別 年齢状況(女)

- ・女性は要介護 1 が一番多く、男性に比べ要支援 1、要支援 2 が多く、比較的介護度の低い段階で、85 歳以上の女性が半数認定されている。




図 8 介護度別 年齢構成(男)

- ・ 84 歳までの男性は各介護度に約 55% を占め、85 歳～94 歳は要支援・要介護 1・2 が多い。

介護度別 年齢構成(女性)




図 9 介護度別 年齢構成(女)

- ・ 65 歳～84 歳の女性は、介護度 3 以上が多く、85 歳～94 歳は要支援・要介護 1・2 が多い。

介護度の割合(全体)




図 10 介護度の割合(全体)

介護度の割合(男性)




図 11 介護度の割合(男)

・男性は、要介護1が28%と一番多く、次いで要介護2が19%。要支援1から要介護1までで全体の約53%を占める。




図 12 介護度の割合(女)

・女性は要介護1が26%と一番多く、次いで要支援2が22%。要支援1から要介護1までで全体の約65%を占め、男性より多い。

3. 地区別による年齢、介護度、発生率(対 65 歳以上人口)の状況



図 13 地区別 年齢(全体)

・天津地区が一番多く、全体の 17.2%を占める。次いで鴨川地区が 14.1%、東条地区が 13.4%を占める。



図 14 地区別 年齢(男)




図 15 地区別 年齢(女)

4-1. 全体 12地区別の年齢状況

年齢	田原	西条	東条	鴨川	大山	吉尾	主基	江見	曾呂	太海	小湊	天津	市外	計	年齢別占有率
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
55～59	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0.6%
60～64	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0.6%
65～69	2	1	3	6	0	0	3	2	2	3	0	10	1	33	6.1%
70～74	3	3	10	4	0	2	2	5	2	2	2	8	1	44	8.1%
75～79	8	5	13	12	2	7	5	5	2	3	6	13	0	81	14.9%
80～84	3	5	14	21	8	6	3	7	3	9	9	13	2	103	18.9%
85～89	7	4	12	14	10	17	10	7	9	8	7	30	1	136	25.0%
90～94	11	5	14	15	5	8	9	11	4	4	8	16	3	113	20.7%
95～99	2	1	6	3	2	2	1	2	1	0	2	3	0	25	4.6%
100～	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0.7%
計	37	25	73	77	28	42	33	41	23	30	34	94	8	545	100.0%
地区別占有率	6.8%	4.6%	13.4%	14.1%	5.1%	7.7%	6.1%	7.5%	4.2%	5.5%	6.2%	17.2%	1.5%	100.0%	—

4-2. 男性 12地区別の年齢状況

年齢	田原	西条	東条	鴨川	大山	吉尾	主基	江見	曾呂	太海	小湊	天津	市外	計	年齢別占有率
40～44														0	0.0%
45～49														0	0.0%
50～54														0	0.0%
55～59	1		1											2	0.8%
60～64				1				1						2	0.8%
65～69	2	1	2	3			1	2	1	2		6	1	21	8.3%
70～74	2	2	4	1		1	1	3	1	2	1	4		22	8.7%
75～79	4	3	10	6	1	2	3	1	1	1	6	5		43	16.9%
80～84	1	4	4	10	5	2	3	4	3	4	6	5		51	20.1%
85～89	1	1	3	8	4	7	4	1	2	2	4	13	1	51	20.1%
90～94	4	2	4	7	3	5	5	5	2	3	2	6	1	49	19.3%
95～99	1	1	2			1		1	1		1	2		10	3.9%
100～				1	1							1		3	1.2%
計	16	14	30	37	14	18	17	18	11	14	20	42	3	254	100.0%
地区別占有率	6.3%	5.5%	11.8%	14.6%	5.5%	7.1%	6.7%	7.1%	4.3%	5.5%	7.9%	16.5%	1.2%	100.0%	—

4-3. 女性 12地区別の年齢状況

年齢	田原	西条	東条	鴨川	大山	吉尾	主基	江見	曾呂	太海	小湊	天津	市外	計	年齢別占有率
40～44														0	0.0%
45～49														0	0.0%
50～54														0	0.0%
55～59										1				1	0.3%
60～64		1												1	0.3%
65～69			1	3			2		1	1		4		12	4.1%
70～74	1	1	6	3		1	1	2	1		1	4	1	22	7.6%
75～79	4	2	3	6	1	5	2	4	1	2		8		38	13.1%
80～84	2	1	10	11	3	4		3		5	3	8	2	52	17.9%
85～89	6	3	9	6	6	10	6	6	7	6	3	17		85	29.2%
90～94	7	3	10	8	2	3	4	6	2	1	6	10	2	64	22.0%
95～99	1		4	3	2	1	1	1			1	1		15	5.2%
100～								1						1	0.3%
計	21	11	43	40	14	24	16	23	12	16	14	52	5	291	100.0%
地区別占有率	7.2%	3.8%	14.8%	13.7%	4.8%	8.2%	5.5%	7.9%	4.1%	5.5%	4.8%	17.9%	1.7%	100.0%	—




図 16 地区別 発生率 (全体)




図 17 地区別 発生率(男)




図 18 地区別 発生率(女)

3-1.全体 地区別の要介護認定状況

	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	非該当	合計	65歳以上	発生率
田原	6	10	8	9	4	0	0	0	37	922	4.01
西条	4	3	6	4	1	5	2	0	25	901	2.77
東条	13	14	24	7	8	3	4	0	73	1,895	3.85
鴨川	11	15	21	13	5	5	7	0	77	2,103	3.66
大山	3	5	10	4	4	2	0	0	28	576	4.86
吉尾	3	6	14	8	6	2	2	1	42	814	5.16
主基	6	7	8	4	1	3	4	0	33	639	5.16
江見	8	8	4	7	6	6	2	0	41	720	5.69
曾呂	3	4	7	5	2	0	2	0	23	665	3.46
太海	6	5	6	6	3	2	2	0	30	752	3.99
小湊	5	2	8	9	3	4	3	0	34	853	3.99
天津	12	17	27	20	10	5	3	0	94	1,618	5.81
市外	0	1	2	0	2	2	1	0	8	0	-
計	80	97	145	96	55	39	32	1	545	12,458	4.37

3-2.男性 地区別の要介護認定状況

	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	非該当	合計	65歳以上	発生率
田原	2	3	3	5	3				16	922	1.74
西条	1	1	6	2	1	3			14	901	1.55
東条	4	5	12	2	3	1	3		30	1,895	1.58
鴨川	2	7	10	6	5	2	5		37	2,103	1.76
大山	2	2	4	1	3	2			14	576	2.43
吉尾	2		7	3	2	1	2	1	18	814	2.21
主基	5	1	4	1	1	2	3		17	639	2.66
江見	2	2	2	3	3	5	1		18	720	2.50
曾呂		2	3	3	1		2		11	665	1.65
太海	3	1	4	4	1		1		14	752	1.86
小湊	3	1	4	6	2	2	2		20	853	2.34
天津	4	7	10	12	4	3	2		42	1,618	2.60
市外			1		1	1			3	0	-
計	30	32	70	48	30	22	21	1	254	12,458	2.04

3-3.女性 地区別の要介護認定状況

	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	非該当	合計	65歳以上	発生率
田原	4	7	5	4	1				21	922	2.28
西条	3	2		2		2	2		11	901	1.22
東条	9	9	12	5	5	2	1		43	1,895	2.27
鴨川	9	8	11	7		3	2		40	2,103	1.90
大山	1	3	6	3	1				14	576	2.43
吉尾	1	6	7	5	4	1			24	814	2.95
主基	1	6	4	3		1	1		16	639	2.50
江見	6	6	2	4	3	1	1		23	720	3.19
曾呂	3	2	4	2	1				12	665	1.80
太海	3	4	2	2	2	2	1		16	752	2.13
小湊	2	1	4	3	1	2	1		14	853	1.64
天津	8	10	17	8	6	2	1		52	1,618	3.21
市外		1	1		1	1	1		5	0	-
計	50	65	75	48	25	17	11	0	291	12,458	2.34

4. 第1疾病に係る性別、年齢、介護度、発生率(対 65 歳以上人口)の状況




図 19 第1疾病名(全体)

- ・全体では、認知症が一番多く、次いで、脳血管疾患、心疾患の順である。
- ・男性は、脳血管疾患が一番多く、次いでがん、認知症、筋骨格系運動疾患の順になっている。
- ・女性は、筋骨格系運動疾患が一番多く、次いで認知症、がんの順となっている。
- ・筋骨格系運動疾患は、ロコモ、脊柱管狭窄症、腰痛、骨粗鬆症、リウマチ性疾患、関節疾患、骨折、その他整形外科疾患をまとめたもの。

年齢	40～64	65～74	75～84	85～	計	占有率
高脂血症	0	0	0	0	0	0.0%
パーキンソン病	0	2	5	1	8	1.5%
糖尿病	0	2	5	6	13	2.4%
腎不全	0	1	5	9	15	2.8%
精神疾患	0	7	5	4	16	2.9%
呼吸器疾患	0	6	4	9	19	3.5%
一	0	1	7	14	22	4.0%
高血圧	0	1	8	25	34	6.2%
その他	1	7	8	22	38	7.0%
心疾患(高血圧を除く)	0	2	9	33	44	8.1%
がん	3	12	34	19	68	12.5%
脳血管疾患	1	16	25	29	71	13.0%
認知症	1	6	31	42	80	14.7%
筋骨格系運動疾患	0	14	38	65	117	21.5%
計	6	77	184	278	545	100.0%




図 20 第1疾病名(男)

年齢	40～64	65～74	75～84	85～	計	占有率
高脂血症	0	0	0	0	0	0.0%
パーキンソン病	0	1	2	0	3	1.2%
糖尿病	0	2	2	4	8	3.1%
腎不全	0	0	4	4	8	3.1%
高血圧	0	0	4	7	11	4.3%
精神疾患	0	5	3	4	12	4.7%
ー	0	1	5	6	12	4.7%
呼吸器疾患	0	4	4	7	15	5.9%
その他	1	6	2	8	17	6.7%
心疾患(高血圧を除く)	0	2	6	14	22	8.7%
筋骨格系運動疾患	0	3	9	17	29	11.4%
認知症	1	2	17	17	37	14.6%
がん	1	6	21	10	38	15.0%
脳血管疾患	1	11	15	15	42	16.5%
計	4	43	94	113	254	100.0%




図 21 第 1 疾病名(女)

年齢	40～64	65～74	75～84	85～	計	占有率
高脂血症	0	0	0	0	0	0.0%
呼吸器疾患	0	2	0	2	4	1.4%
精神疾患	0	2	2	0	4	1.4%
糖尿病	0	0	3	2	5	1.7%
パーキンソン病	0	1	3	1	5	1.7%
腎不全	0	1	1	5	7	2.4%
ー	0	0	2	8	10	3.4%
その他	0	1	6	14	21	7.2%
心疾患(高血圧を除く)	0	0	3	19	22	7.6%
高血圧	0	1	4	18	23	7.9%
脳血管疾患	0	5	10	14	29	10.0%
がん	2	6	13	9	30	10.3%
認知症	0	4	14	25	43	14.8%
筋骨格系運動疾患	0	11	29	48	88	30.2%
計	2	34	90	165	291	100.0%




図 22 第1疾病名 介護度(全体)

認定介護度	要支援	要介護1・2	要介護3	要介護4・5	非該当	合計	占有率
高脂血症	0	0	0	0	0	0	0.0%
パーキンソン病	2	6	0	0	0	8	1.5%
糖尿病	4	6	0	3	0	13	2.4%
腎不全	9	4	2	0	0	15	2.8%
精神疾患	4	7	5	0	0	16	3.0%
呼吸器疾患	7	6	2	4	0	19	3.5%
ー	7	11	1	3	0	22	4.1%
高血圧	12	17	0	0	0	29	5.4%
その他	16	16	2	4	0	38	7.0%
心疾患(高血圧を除く)	19	14	3	8	0	44	8.1%
がん	15	29	8	16	0	68	12.6%
脳血管疾患	19	30	8	13	1	71	13.1%
認知症	10	51	13	6	0	80	14.8%
筋骨格系運動疾患	46	45	12	14	0	117	21.7%
計	170	242	56	71	1	540	100.0%

第1疾病名一介護度 (男性)




図 23 第1疾病名 介護度(男)

認定介護度	要支援	要介護1・2	要介護3	要介護4・5	非該当	合計	占有率
高脂血症	0	0	0	0	0	0	0.0%
パーキンソン病	1	2	0	0	0	3	1.2%
糖尿病	1	5	0	2	0	8	3.1%
腎不全	4	2	2	0	0	8	3.1%
高血圧	5	6	0	0	0	11	4.3%
精神疾患	3	6	3	0	0	12	4.7%
一	2	8	1	1	0	12	4.7%
呼吸器疾患	6	4	1	4	0	15	5.9%
その他	6	8	1	2	0	17	6.7%
心疾患(高血圧を除く)	11	5	1	5	0	22	8.7%
筋骨格系運動疾患	9	12	2	6	0	29	11.4%
認知症	4	24	5	4	0	37	14.6%
がん	4	15	8	11	0	38	15.0%
脳血管疾患	6	21	6	8	1	42	16.5%
計	62	118	30	43	1	254	100.0%



図 24 第1疾病名 介護度(女)

認定介護度	要支援	要介護1・2	要介護3	要介護4・5	非該当	合計	占有率
高脂血症	0	0	0	0	0	0	0.0%
呼吸器疾患	1	2	1	0	0	4	1.4%
精神疾患	1	1	2	0	0	4	1.4%
糖尿病	3	1	0	1	0	5	1.7%
パーキンソン病	1	4	0	0	0	5	1.7%
腎不全	5	2	0	0	0	7	2.4%
—	5	3	0	2	0	10	3.4%
その他	10	8	1	2	0	21	7.2%
心疾患(高血圧を除く)	8	9	2	3	0	22	7.6%
高血圧	12	11	0	0	0	23	7.9%
脳血管疾患	13	9	2	5	0	29	10.0%
がん	11	14	0	5	0	30	10.3%
認知症	6	27	8	2	0	43	14.8%
筋骨格系運動疾患	39	32	9	8	0	88	30.2%
計	115	123	25	28	0	291	100.0%

第1疾病 地区(全体)




図 25 第1疾病名 地区(全体)

年齢	鴨川	長狭	江見	天津小湊	市外	計	占有率
高脂血症	0	0	0	0	0	0	0
パーキンソン病	3	2	2	1	0	8	1.47
糖尿病	3	4	2	4	0	13	2.39
腎不全	4	4	2	5	0	15	2.75
精神疾患	7	3	2	3	1	16	2.94
呼吸器疾患	6	7	1	5	0	19	3.49
ー	11	1	4	6	0	22	4.04
高血圧	12	6	10	6	0	34	6.24
その他	22	5	4	6	1	38	6.97
心疾患(高血圧を除く)	20	5	9	10	0	44	8.07
がん	21	12	16	18	1	68	12.48
脳血管疾患	22	18	14	16	1	71	13.03
認知症	27	16	12	21	4	80	14.68
筋骨格系運動疾患	54	20	16	27	0	117	21.47
計	212	103	94	128	8	545	100
占有率	38.9%	18.9%	17.2%	23.5%	1.5%	100.0%	

第1疾病 地区(男性)




図 26 第1疾病名 地区(男)

疾病	鴨川	長狭	江見	天津小湊	市外	計	占有率
高脂血症	0	0	0	0	0	0	0
パーキンソン病	1	0	2	0	0	3	1.18
糖尿病	2	2	2	2	0	8	3.15
腎不全	1	1	1	5	0	8	3.15
高血圧	2	3	3	3	0	11	4.33
精神疾患	4	3	2	3	0	12	4.72
ー	6	1	2	3	0	12	4.72
呼吸器疾患	5	6	1	3	0	15	5.91
その他	12	2	2	1	0	17	6.69
心疾患(高血圧を除く)	11	1	6	4	0	22	8.66
筋骨格系運動疾患	14	3	3	9	0	29	11.42
認知症	13	9	5	8	2	37	14.57
がん	10	8	8	11	1	38	14.96
脳血管疾患	16	10	6	10	0	42	16.54
計	97	49	43	62	3	254	100
占有率	17.8%	9.0%	7.9%	11.4%	0.6%	46.6%	

第1疾病 地区(女性)




図 27 第1疾病名 地区(女)

年齢	鴨川	長狭	江見	天津小湊	市外	計	占有率
高脂血症	0	0	0	0	0	0	0
呼吸器疾患	1	1	0	2	0	4	1.37
精神疾患	3	0	0	0	1	4	1.37
糖尿病	1	2	0	2	0	5	1.72
パーキンソン病	2	2	0	1	0	5	1.72
腎不全	3	3	1	0	0	7	2.41
一	5	0	2	3	0	10	3.44
その他	10	3	2	5	1	21	7.22
心疾患(高血圧を除く)	9	4	3	6	0	22	7.56
高血圧	10	3	7	3	0	23	7.9
脳血管疾患	6	8	8	6	1	29	9.97
がん	11	4	8	7	0	30	10.31
認知症	14	7	7	13	2	43	14.78
筋骨格系運動疾患	40	17	13	18	0	88	30.24
計	115	54	51	66	5	291	100
占有率	21.1%	9.9%	9.4%	12.1%	0.9%	53.4%	




図 28 筋骨格系運動疾患 地区別

・筋骨格運動器疾患は、男女ほぼ同じ傾向で、天津、東条、鴨川が多い。

筋骨格系運動疾患

	男	女	計	男	女	計
田原	2	10	12	6.9	11.4	10.3
西条	1	4	5	3.4	4.5	4.3
東条	5	11	16	17.2	12.5	13.7
鴨川	6	15	21	20.7	17.0	17.9
大山	0	4	4	0.0	4.5	3.4
吉尾	2	9	11	6.9	10.2	9.4
主基	1	4	5	3.4	4.5	4.3
江見	0	4	4	0.0	4.5	3.4
曾呂	1	2	3	3.4	2.3	2.6
太海	2	7	9	6.9	8.0	7.7
小湊	3	4	7	10.3	4.5	6.0
天津	6	14	20	20.7	15.9	17.1
市外	0	0	0	0.0	0.0	0.0
計	29	88	117	100.0	100.0	100.0




図 29 認知症 地区別

認知症

	男	女	計	男	女	計
田原	5	2	7	13.5	4.7	8.8
西条	2	0	2	5.4	0.0	2.5
東条	3	7	10	8.1	16.3	12.5
鴨川	3	5	8	8.1	11.6	10.0
大山	2	2	4	5.4	4.7	5.0
吉尾	5	4	9	13.5	9.3	11.3
主基	2	1	3	5.4	2.3	3.8
江見	4	3	7	10.8	7.0	8.8
曾呂	1	2	3	2.7	4.7	3.8
太海	0	2	2	0.0	4.7	2.5
小湊	2	6	8	5.4	14.0	10.0
天津	6	7	13	16.2	16.3	16.3
市外	2	2	4	5.4	4.7	5.0
計	37	43	80	100.0	100.0	100.0




図 30 脳血管疾患 地区別

脳血管疾患

	男	女	計	男	女	計
田原	3	1	4	7.1	3.4	5.6
西条	2	0	2	4.8	0.0	2.8
東条	4	2	6	9.5	6.9	8.5
鴨川	7	3	10	16.7	10.3	14.1
大山	1	2	3	2.4	6.9	4.2
吉尾	4	2	6	9.5	6.9	8.5
主基	5	4	9	11.9	13.8	12.7
江見	0	4	4	0.0	13.8	5.6
曾呂	2	2	4	4.8	6.9	5.6
太海	4	2	6	9.5	6.9	8.5
小湊	3	1	4	7.1	3.4	5.6
天津	7	5	12	16.7	17.2	16.9
市外	0	1	1	0.0	3.4	1.4
計	42	29	71	100.0	100.0	100.0




図 31 がん 地区別

がん

	男	女	計	男	女	計
田原	2	0	2	5.3	0.0	2.9
西条	0	2	2	0.0	6.7	2.9
東条	4	5	9	10.5	16.7	13.2
鴨川	4	4	8	10.5	13.3	11.8
大山	4	0	4	10.5	0.0	5.9
吉尾	2	4	6	5.3	13.3	8.8
主基	2	0	2	5.3	0.0	2.9
江見	6	3	9	15.8	10.0	13.2
曾呂	2	2	4	5.3	6.7	5.9
太海	0	3	3	0.0	10.0	4.4
小湊	6	0	6	15.8	0.0	8.8
天津	5	7	12	13.2	23.3	17.6
市外	1	0	1	2.6	0.0	1.5
計	38	30	68	100.0	100.0	100.0

10-1.全体 主要第1傷病名に対する第2傷病名の状況

		第1傷病名					
		認知症	脳血管疾患	がん	心疾患(高血圧を除く)	その他	計
第2傷病名	高血圧	12	10		9	5	36
	高脂血症	2				1	3
	脳血管疾患	8	7	3		4	22
	心疾患(高血圧を除く)	5	9	4	12	3	33
	糖尿病	4	8	4	1	2	19
	認知症	1	2	1	1	2	7
	骨折	4	1	1	1	1	8
	関節疾患	3	1		1		5
	腰痛	1	2	1			4
	骨粗鬆症					1	1
	脊柱管狭窄症	1					1
	その他整形外科疾患		2			1	3
	リウマチ性疾患	1	1	1			3
	ロコモ	1					1
	がん	2	1	10		5	18
	腎不全		2	1	3	1	7
	呼吸器疾患	1	3	7	6		17
	パーキンソン病						0
	精神疾患	3	2			2	7
	その他	14	7	5	5	4	35
	—	17	13	30	5	6	71
	合計	80	71	68	44	38	301

・第1疾病は、認知症が一番多く、次いで脳血管疾患、がん、心疾患の順である。

認知症に対する第2傷病名

脳血管疾患に対する第2傷病名

がんに対する第2傷病名

心疾患に対する第2傷病名

認知症		脳血管疾患		がん		心疾患(高血圧を除く)	
高血圧	12 15.0%	高血圧	10 14.1%	がん	10 14.7%	心疾患(高血圧を除く)	12 27.3%
その他	14 17.5%	心疾患(高血圧を除く)	9 12.7%	呼吸器疾患	7 10.3%	高血圧	9 20.5%
脳血管疾患	8 10.0%	糖尿病	8 11.3%	その他	5 7.4%	呼吸器疾患	6 13.6%
心疾患(高血圧を除く)	5 6.3%	脳血管疾患	7 9.9%	心疾患(高血圧を除く)	4 5.9%	その他	5 11.4%
糖尿病	4 5.0%	その他	7 9.9%	糖尿病	4 5.9%		0.0%
—	37 46.3%	—	30 42.3%	—	38 55.9%	—	12 27.3%
計	80 100.0%	計	71 100.0%	計	68 100.0%	計	44 100.0%

その他に対する第2傷病名

その他	
高血圧	5 13.2%
がん	5 13.2%
脳血管疾患	4 10.5%
その他	4 10.5%
心疾患(高血圧を除く)	3 7.9%
—	17 44.7%
計	38 100.0%

10-2.男性 主要第1傷病名に対する第2傷病名の状況

		第1傷病名				
		脳血管疾患	がん	認知症	心疾患(高血圧を除く)	その他
第2傷病名	高血圧	3		3	3	2
	高脂血症			1		
	脳血管疾患	5	2	5		3
	心疾患(高血圧を除く)	5	3	1	5	3
	糖尿病	7	3	2	1	1
	認知症	1		1	1	
	骨折		1	1		
	関節疾患			1		
	腰痛	1	1			
	骨粗鬆症					
	脊柱管狭窄症			1		
	その他整形外科疾患	1				
	リウマチ性疾患					
	ロコモ			1		
	がん	1	4	1		2
	腎不全	2	1		1	1
	呼吸器疾患	1	5	1	5	
	パーキンソン病					
	精神疾患			2		1
	その他	5	1	6	2	2
	—	10	17	10	4	2
	合計	42	38	37	22	17

・男性の場合は、脳血管疾患が一番多く、次いでがん、認知症、心疾患の順である。

脳血管疾患に対する第2傷病名 がんに対する第2傷病名 認知症に対する第2傷病名 心疾患に対する第2傷病名

	脳血管疾患		がん		認知症		心疾患(高血圧を除く)
糖尿病	7	16.7%	呼吸器疾患	5	13.2%	その他	6
脳血管疾患	5	11.9%	がん	4	10.5%	脳血管疾患	5
心疾患(高血圧を除く)	5	11.9%	心疾患(高血圧を除く)	3	7.9%	高血圧	3
その他	5	11.9%	糖尿病	3	7.9%	糖尿病	2
高血圧	3	7.1%	脳血管疾患	2	5.3%	精神疾患	2
—	17	40.5%	—	21	55.3%	—	19
計	42	100.0%	計	38	100.0%	計	37

その他に対する第2傷病名

	その他	
脳血管疾患	3	17.6%
心疾患(高血圧を除く)	3	17.6%
高血圧	2	11.8%
がん	2	11.8%
その他	2	11.8%
—	5	29.4%
計	17	100.0%

10-3.女性 主要第1傷病名に対する第2傷病名の状況

		第1傷病名					
		認知症	がん	脳血管疾患	高血圧	骨折	計
第2傷病名	高血圧	9		7		1	17
	高脂血症	1			1		2
	脳血管疾患	3	1	2		1	7
	心疾患(高血圧を除く)	4	1	4	2	1	12
	糖尿病	2	1	1		1	5
	認知症		1	1	2	1	5
	骨折	3		1	1	1	6
	関節疾患	2		1	1	1	5
	腰痛	1		1	1		3
	骨粗鬆症				2	2	4
	脊柱管狭窄症				1		1
	その他整形外科疾患			1	4	1	6
	リウマチ性疾患	1	1	1			3
	ロコモ						0
	がん	1	6		1		8
	腎不全						0
	呼吸器疾患		2	2		1	5
	パーキンソン病					1	1
	精神疾患	1		2	2	1	6
	その他	8	4	2	3	5	22
	—	7	13	3	2	5	30
	合計	43	30	29	23	23	148

・女性では、認知症が一番多く、次いで、がん、脳血管疾患、高血圧の順である。

認知症に対する第2傷病名 がんに対する第2傷病名 脳血管疾患に対する第2傷病名 高血圧に対する第2傷病名

	認知症			がん			脳血管疾患			高血圧		
高血圧	9	20.9%	がん	6	14.0%	高血圧	7	16.3%	その他整形外科疾患	4	9.3%	
その他	8	18.6%	呼吸器疾患	2	4.7%	心疾患(高血圧を除く)	4	9.3%	その他	3	7.0%	
心疾患(高血圧を除く)	4	9.3%	その他	4	9.3%			0.0%			0.0%	
脳血管疾患	3	7.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
骨折	3	7.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
—	16	37.2%	—	31	72.1%	—	32	74.4%	—	36	83.7%	
計	43	100.0%	計	43	100.0%	計	43	100.0%	計	43	100.0%	

骨折に対する第2傷病名

	骨折	
その他	5	11.6%
骨粗鬆症	2	4.7%
		0.0%
		0.0%
		0.0%
—	36	83.7%
計	43	100.0%

5. 第1疾病の平成26年度と平成29年度の比較




図 32 平成26年度と平成29年度比較




図 33 平成26年度との増減

診断名1	平成26年	平成30年	増減
高脂血症	8	0	-8
パーキンソン病	6	8	2
糖尿病	15	13	-2
腎不全	13	15	2
精神疾患	14	16	2
呼吸器疾患	20	19	-1
高血圧	32	34	2
その他	70	38	-32
心疾患 (高血圧を除く)	38	44	6
がん	23	68	45
脳血管疾患	58	71	13
認知症	66	80	14
筋骨格運動器疾患	145	117	-28
合計	508	523	15